



## INFORMACION Y INSTRUCCIONES PARA PACIENTES DE MICROFLEBECTOMIA

### ANTES DE SU PROCEDIMIENTO:

- **NADA DE COMIDA O BEBIDA DESPUES DE MEDIANOCHE.**
- Puede tomar medicamentos esencial la mañana de su procedimiento con un bocado de agua.
- Si toma aspirina, discontinuar 10 dias antes de su procedimiento.
- Si esta usando Plavix, tiene que parar 10 dias antes de su procedimiento, pero, **TIENE QUE CONSULTAR CON SU MEDICO QUE RECETO ANTES DE PARAR PLAVIX.**
- Si esta usando Coumadin, tiene que parar 5 dias antes de su procedimiento, pero, **TIENE QUE CONSULTAR CON SU MEDICO QUE RECETO ANTES DE PARA COUMADIN.**

### DESPUES DE SU PROCEDIMIENTO:

- Retire su vendaje post-operatorio **DESPUES de 48 horas.**
- Es normal que el vendaje tenga manchas de sangrae, no se alertara.
- Tenemos que ver le en la oficina 1 o 2 semanas despues de su cirugia. Por favor llame para hacer un appoinment.
- Despues de retirar su vendaje, puede banarse. No use banos calientes, banera de hidromasaje, saunas o salas de vapor por 2 semanas.
- Tiene que ponerse la media de compresion por 2 semanas despues de la cirugia.
- Continue sus actividades normales lo pronto posible. Camine lo mas posible, pero no haga ejercicio aerobico esforzado por 2 semanas.
- Es normal que experiencia un poco de comezon y dolor leve. Puede tomar Tylenol si necesita. Tambien le vamos a dar una receta para Percocet.
- Evite exposicion de sol. La exposicion de sol empeorar los resultados cosmeticos.
- Si experiencia mucho dolor, hinchazon de la pierna o fiebre, por favor contacte al Dr. Nackman.