

SU PREPARACIÓN - Miralax / Gatorade

Compre estos artículos con anticipación (no se requieren recetas)

- **Cuatro tabletas de Dulcolax® de 5 mg**
- **Una de 8 oz. botella de MiraLAX**
- **64 oz. de Gatorade (sin sabores rojos)**
- **Desitin® o Vaseline® pueden usarse para proteger el área anal, especialmente si tiene hemorroides.**

Fecha del procedimiento: ____ / ____ / ____ Hora: ____ : ____ AM/PM

Reportar a GI LAB de salud digestiva (900 W. Nelson) Llegue a las: ____ : ____ AM/PM



EL DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

NADA DE ALIMENTOS SÓLIDOS EL DÍA COMPLETO ANTES DE SU EXAMEN. DEBE TENER UNA DIETA DE LÍQUIDOS CLAROS TODO EL DÍA.

MEDICAMENTOS:

Los medicamentos para la presión arterial y el corazón se pueden tomar hasta las 7 a.m. de la mañana del procedimiento con un sorbo de agua.

- Si está tomando Pradaxa, Xarelto o Eliquis, descontinúe 2 días antes de su procedimiento.
- Si está tomando Plavix, Clopidogrel, Coumadin o Warfarin, suspenda el tratamiento 5 días antes de su examen.
- Si está tomando aspirina, puede seguir tomando.

DIABÉTICOS:

No tome medicamentos para diabéticos el día de su prueba. Compruebe su nivel de azúcar en sangre en casa la mañana del procedimiento.

Té y café	Jugo de manzana / uva	Limonada	Bebida carbonatada Bebidas
			
deportivas	gelatina	Caldo de/ Agua de coco	Miel / Azúcar
			

