

TWÓJ PRZYGOTOWANIE - Miralax / Gatorade

Kup te produkty z wyprzedzeniem (recepty nie są wymagane)

- **Cztery tabletki Dulcolax® 5 mg**
- **Jedna, 8 uncji. butelka MiraLAX**
- **64 oz. Gatorade (bez czerwonych aromatów)**
- **Desitin® lub Vaseline® mogą być używane do ochrony okolicy odbytu, szczególnie w przypadku hemoroidów.**

Data zabiegu: ____ / ____ / ____ Godzina: ____ : ____ AM/PM

Zgłoś się do Zdrowia układu pokarmowego GI LAB (900 W. Nelson) Przyjazd o: ____ : ____ AM/PM



DZIEŃ PRZED PROCEDURĄ:

BRAK POKARMÓW STAŁYCH. CAŁY DZIEŃ PRZED EGZAMINEM MUSISZ BYĆ NA CZYSTEJ PŁYNNEJ DIECIE PRZEZ CAŁY DZIEŃ.

Lekarstw:

ciśnienie krwi i leki serce może zostać podjęta dopiero 7 rano rano zabiegu z łykiem wody.

- Jeśli jesteś na Pradaxa, Xarelto lub Eliquis, przerwij 2 dni przed testem.
- Jeśli stosujesz Plavix, Clopidogrel, Coumadin lub Warfarin, odstawić na 5 dni przed badaniem.
- Jeśli przyjmujesz jakiegokolwiek aspirynę, możesz kontynuować przyjmowanie.

CUKRZYCA:

W dniu testu nie należy przyjmować leków przeciwcukrzycowych. Proszę sprawdzić poziom cukru we krwi rano w domu.

Herbata i kawa	Sokwinogronowy	Lemoniada	Napoje gazowane Napoje
			

sportowe	jabłkowo-Jell-O	Bulion / Woda kokosowa	Miód / cukier
			

