




Thank you for scheduling your procedure/s with us and trusting us with your healthcare needs. Below you will find some useful reminders in regards to your up-coming procedure/s. If you have any questions, please feel free to contact our office at 702-982-7240, Monday to Friday, 8am-5pm or send us an email at [lvg@lvgastro.com](mailto:lvg@lvgastro.com)

### **Facility Location: LAS VEGAS ENDOSCOPY (LVE)**

**7315 S. PECOS ROAD, SUITE 103 LAS VEGAS, NV 89120 Phone: 702-855-0550**



*CANCELLATION POLICY In order to provide the best care and service to our patients, we ask that you notify us 3 days in advance to cancel or reschedule your appointment Please be advised that failure to do could result in a missed appointment fee of \$75. After 3 missed appointments (failure to show or call), you may be discharged from care as a direct result of being non-compliant to treatment.*

# Instrucciones de preparación para una endoscopia superior

## ¿Cómo me preparo para una endoscopia superior?



**HABLE DE LOS MEDICAMENTOS y PROBLEMAS MÉDICOS** que tiene con su médico.

Requerirá instrucciones especiales referentes a estos medicamentos:

- Anticoagulantes/ Diluyentes de la sangre
- Medicamentos antiplaquetarios como Plavix
- Medicamentos para la presión arterial
- Si así se lo ordenan, deje de tomar todos los medicamentos de hierro, aspirina y antiinflamatorios no esteroides (NSAID, por sus siglas en inglés), tales como Motrin, Ibuprofen y Advil.

Avise a su médico si tiene estos problemas médicos:

- Soplos cardíacos
- Cirugía previa de válvulas cardíacas
- Trastornos hemorrágicos



**HAGA PREPARATIVOS** for para que un amigo o familiar le lleve a casa después del procedimiento, en caso de que vayan a sedarlo, ya que usted seguirá adormilado y manejar sería arriesgado.

- El día del procedimiento tiene que regresar a casa acompañado de una persona adulta, aunque lo haga en taxi. El personal del procedimiento médico debe poder contactar a la persona que lo acompañará. Si no se puede confirmar quién es esta persona antes del procedimiento, será necesario aplazarlo hasta otra fecha por motivos de seguridad.
- No debe manejar un automóvil, operar maquinaria ni tomar decisiones legales hasta el día después de su procedimiento.



**LA NOCHE ANTERIOR** al procedimiento, **no consuma alimentos sólidos** después de las 12:00 am (medianoche). **No tome ningún medicamento** después de la medianoche, a menos de que su médico le haya pedido específicamente que lo haga (p.ej., medicamentos para la presión arterial). **Solamente podrá tomar líquidos claros** después de la medianoche. Líquidos claros son aquellos líquidos que le permitirían leer un periódico a través de ellos.

**LOS LÍQUIDOS CLAROS INCLUYEN:**

- Agua, agua mineral
- Jugos de fruta claros sin pulpa (manzana, uva blanca, arándano blanco, limonada, etc.)
- Sodas o bebidas deportivas claras con gas y sin gas
- Caldo comprado en la tienda y que esté libre de grasa en >99% (caldo de pollo, carne, vegetal o de huesos)
- Paletas heladas o gelatina (como Jell-O)
- Café o té (sin leche ni crema) No consuma ningún líquido de color rojo, morado ni naranja.



**4 HORAS ANTES** del procedimiento, **DEJE DE TOMAR TODOS LOS LÍQUIDOS CLAROS Y MEDICAMENTOS**. Esto significa que no debe comer ni beber nada 4 horas antes de la endoscopia superior ni en adelante.