



Thank you for scheduling your procedure/s with us and trusting us with your healthcare needs. Below you will find some useful reminders in regards to your up-coming procedure/s. If you have any questions, please feel free to contact our office at 702-982-7240, Monday to Friday, 8am-5pm or send us an email at [lvg@lvgastro.com](mailto:lvg@lvgastro.com)

### **Facility Location: LAS VEGAS GASTROENTEROLOGY (LVG)**

**7315 S. PECOS ROAD, SUITE 101 LAS VEGAS, NV 89120 Phone: 702-855-0550**

*CANCELLATION POLICY In order to provide the best care and service to our patients, we ask that you notify us 3 days in advance to cancel or reschedule your appointment Please be advised that failure to do could result in a missed appointment fee of \$75. After 3 missed appointments (failure to show or call), you may be discharged from care as a direct result of being non-compliant to treatment.*



**HABLE SOBRE SUS MEDICAMENTOS** y sobre cualquier afección médica que tenga con su médico. Su médico le dará instrucciones para ajustar apropiadamente sus medicamentos antes de su prueba. Las instrucciones podrían incluir los siguientes cambios:

- Si tiene diabetes, es posible que deba ajustar sus medicamentos. Consulte con el médico que le extiende sus recetas.
- Tome sus medicamentos programados con una pequeña cantidad de agua al menos 3 horas antes de su prueba.
- Es posible que necesite dejar de tomar ciertos medicamentos para que le hagan esta prueba. Lea los detalles a continuación.

## SI TOMA ALGUNA DE LAS MEDICINAS QUE SE ENUMERAN ABAJO, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES:



### 7 DÍAS ANTES DE SU PRUEBA DEJE DE TOMAR

- Hierro oral.



### 1 DÍA ANTES DE SU PRUEBA DEJE DE TOMAR

- **Pepto-Bismol**
- **Antiácidos líquidos:** Esto incluye pero no se limita a Maalox y Mylanta.



### EL DÍA ANTES DE SU PRUEBA

- No beba líquidos rojos o morados.
- A las 12 del medio día, inicie una dieta de líquidos claros. A partir de este momento, no debe comer nada sólido excepto líquidos claros.

### LOS LÍQUIDOS TRANSPARENTES INCLUYEN:

- Agua, agua mineral
- Jugos de frutas claros sin pulpa (de manzana, uvas verdes, arándanos blancos, limonada, etc.)
- Bebidas transparentes carbonatadas y no carbonatadas o bebidas deportivas
- Caldo comercial y caldo >99 % libre de grasa (de pollo, res, vegetales o caldo de hueso)
- Paletas de hielo o gelatina (como Jell-O)
- Café o té (sin leche o crema) No beba líquidos rojos o morados



**LA NOCHE ANTES DE SU PRUEBA** no coma ni beba nada después de la media noche.



### LA MAÑANA DE SU PRUEBA

- Tome con una pequeña cantidad de agua sus medicinas habituales de la mañana (incluidas sus medicinas para la presión arterial) al menos 3 horas antes de su procedimiento. No coma, beba ni fume. (Recuerde no tomar los medicamentos arriba indicados.)



## DURANTE LA PRUEBA

- Colocaremos un cinturón alrededor de su abdomen inferior. Esto deberá permanecer en su lugar durante la duración del estudio
- También usará un dispositivo de grabación que deberá llevar durante toda la prueba. (Trate el equipo con cuidado para que no se dañe.)
- Se le indicará que se trague la cápsula con una taza de agua. La cápsula tiene el tamaño de una píldora grande.
- Después de tragar la cápsula:
  - Puede salir del consultorio, **pero debe regresar a las 4 p.m** o a la hora especificada que se le haya dado, para devolver el monitor. Si el monitor se apaga o la luz azul del monitor deja de parpadear, puede regresar a la oficina
  - **Cada 15 minutos** necesitará verificar que la luz azul de la grabadora está destellando. Si deja de destellar o cambia de color, regrese al consultorio y díganos a qué hora dejó de destellar.
  - **Camine** de 5 a 10 minutos cada 20 a 30 minutos, para que la cápsula se pueda mover por su tubo digestivo.
  - **2 horas después** de tragar la cápsula puede beber líquidos transparentes.
  - **4 horas después** de tragar la cápsula puede beber líquidos transparentes y almorzar ligeramente, como la mitad de un emparedado o un tazón de sopa. No coma ni beba nada que sea rojo, morado o negro.
- **Evite lo siguiente:**
  - Actividades físicas extenuantes, y no se doble o encorve durante la prueba.
  - Campos electromagnéticos como dispositivos de IRM o radiocomunicaciones de aficionados (ham radios) después de tragarse la cápsula y hasta después de un movimiento intestinal.
  - Dormir durante la prueba.