



**“En Estados Unidos, al igual que yo cerca de 750 mil mujeres han usado Mifeprex.”**

## ¿Dónde puedo obtener más información?

Para obtener más información sobre Mifeprex, por favor llama nuestra línea de atención de 24 horas al 1-877-4-EARLY OPTION (1-877-432-7596) o visita nuestra página web: [www.earlyoptionpill.com](http://www.earlyoptionpill.com).

## ¿Cómo accedo a esta opción privada?

Mifeprex está disponible en consultorios médicos y clínicas dentro de todo el país. Tienes que asistir a tres consultas a lo largo de dos semanas. Durante la primera recibes asesoría y, si optas por terminar el embarazo con Mifeprex, firmarás un formato de Consentimiento de la Paciente. Después tomarás tres tabletas de Mifeprex. Dos días después regresarás y tomarás dos tabletas de misoprostol. Finalmente, en unos 12 días irás a una tercera consulta de seguimiento para asegurar que ya no hay embarazo. Ésta es una revisión muy importante, pues si todavía hay embarazo, es posible que haya defectos congénitos, por lo que posiblemente requerirás un procedimiento quirúrgico para terminar con el embarazo. Lo más importante, y para muchas mujeres lo atractivo de Mifeprex es la privacidad.

## ¿Recibiré la asesoría y apoyo que necesito?

A lo largo del proceso recibirás el apoyo y asesoría necesarios. Si tienes preguntas rutinarias puedes llamar a tu proveedor de servicios médicos durante horas de oficina. Él o ella te proporcionará otro número al que podrás llamar en caso de emergencia, por tu parte deberás tener contigo la Guía Médica en caso que vayas a una sala de urgencias o con otro u otra proveedora de atención médica distinto al que te recetó Mifeprex, para que sepa que ya estás tomando Mifeprex para tener un aborto médico inducido.

## Pregúntanos sobre Mifeprex.



Descubre porque más mujeres toman esta opción temprana aprobada por la FDA, que no requiere intervención quirúrgica para abortar durante los primeros 49 días de embarazo.



DANCO LABORATORIES

\*Mifeprex is a registered trademark of Danco Laboratories, LLC.  
©2007

MIFEPREX®

(Mifepristone) Tablets, 200 mg

# Respuestas es lo que necesitas para tomar una decisión informada sobre Mifeprex.



**¿Qué tipo de efectos secundarios puedo esperar?** Aunque es de esperar que haya cólicos y sangrado al poner fin al embarazo, es muy raro que ocurra una hemorragia seria que ponga en peligro la vida, o que se presenten infecciones u otro tipo de problemas después de un aborto espontáneo, un aborto quirúrgico, un aborto médico o un parto. En la eventualidad de estas circunstancias se requiere atención médica inmediata. Muy, muy pocas mujeres han fallecido a causa de una infección seria después de optar por el régimen de Mifeprex para terminar con su embarazo. No hay información que señale que la medicación fue causa de la defunción.

**En caso de presentar los siguientes síntomas comunícate inmediatamente con su proveedor de servicios médicos:**

- **Fuerte hemorragia.** Comunícate inmediatamente con tu proveedor de servicios médicos si sangras lo suficiente como para empapar totalmente dos toallas femeninas regulares por hora, durante dos horas consecutivas o si te preocupa un sangrado abundante. Aproximadamente, en 1 de cada 100 mujeres, el sangrado puede ser tan abundante que requerirá un procedimiento quirúrgico (aborto quirúrgico/D&C) para detenerlo.
- **Dolor abdominal o “sentirse mal”.** Si tienes dolor abdominal o molestia, o te “sientes mal”, y los malestares incluyen debilidad, náusea, vómito o diarrea, con o sin fiebre, más de 24 horas después que tomaste misoprostol, debes comunicarte inmediatamente con tu proveedor de servicios médicos. Estos síntomas pueden ser señal de una fuerte infección u otro problema (incluido un embarazo ectópico, es decir, un embarazo fuera de la matriz).
- **Fiebre.** Si tienes fiebre de 40°C (100.4°F) o más, por más de cuatro horas comunícate inmediatamente con tu proveedor de servicios médicos. La fiebre puede ser síntoma de una infección seria u otro problema (incluido un embarazo ectópico).

**¿Qué hace que Mifeprex® sea una buena opción para terminar con un embarazo durante los primeros 49 días?** Mifeprex es la única opción aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos para inducir un aborto temprano sin recurrir a una cirugía. Estudios

**“Opté por Mifeprex, ya que quería poder evitar la cirugía.”**

clínicos han mostrado que la efectividad de Mifeprex es de 92–95% para terminar de forma segura con un embarazo (5–8% de mujeres requerirán un procedimiento quirúrgico para terminar con el embarazo o detener una fuerte hemorragia). Con esta historia de seguridad y eficacia, su uso sigue creciendo.

Las pacientes pueden esperar que haya sangrado o manchado de sangre durante 9–16 días en promedio. También pueden esperar que haya cólicos. Entre los efectos secundarios que pueden esperar se encuentran náusea, dolor de cabeza, diarrea, vómito, mareo, cansancio y dolor en la espalda.

**¿Por qué cada vez hay más mujeres que eligen Mifeprex?** Aproximadamente 750 mil mujeres en Estados Unidos, al igual que millones de mujeres en todo el mundo, han elegido esta opción. Algunas de sus ventajas son las siguientes:

- Es una opción más privada para terminar con un embarazo.
- Es muy sencillo, simplemente se toma una tableta.
- Permite evitar cirugía y anestesia en la mayoría de los casos.

**¿Cómo funciona esta opción temprana?** Dado que Mifeprex es una tableta que se toma por vía oral no requiere de cirugía o anestesia en la mayoría de los casos. Es una tableta que bloquea una hormona necesaria para que continúe tu embarazo. Cuando es seguida de otro medicamento, misoprostol, Mifeprex termina el embarazo. La Guía Médica que recibirás durante la primera consulta te explicará con más detalle cómo funciona.

**“Me gustó la privacidad de este procedimiento en un momento tan difícil.”**

**¿Mifeprex estará bien para mí?** Mifeprex puede tomarse únicamente

durante los primeros 49 días de embarazo y no puede utilizarse en caso de sospecha o confirmación de embarazo ectópico, ya que Mifeprex no es efectivo para terminar con ese tipo de embarazo. Consulta con tu proveedor o proveedora de servicios médicos para saber si Mifeprex es la opción correcta para ti. Además, si estás tomando otros medicamentos no olvides mencionarlo a tu proveedor de servicios médicos.