Địa chỉ: 10425 Huffmeister Rd - Suite 280, Houston, TX - 77065
Điện thoại: 832-632-4070 / Fax: 832-688-9496 / Email: info@gastrodoxs.com / Website: www.gastrodoxs.com

COLYTE / GAVILYTE N, C, G / GOLYTELY / NULYTELY / PEG 3350

- ☐ **5 NGÀY TRƯỚC KHI THỦ TỤC**
  - ☐ **UỐNG NHIỀU NƯỚC**
  - ☐ **KHÔNG ĂN HẠT** - quả mọng, hạt điều, hạt ngô, đậu phộng, hồ đào, bỏng ngô, hạt hướng dương, quả óc chó.

- ☐ **3 NGÀY TRƯỚC KHI THỦ TỤC**
  - ☐ **UỐNG NHIỀU NƯỚC**
  - ☐ **ĂN THEO CHẾ ĐỘ ÍT CHẤT XƠ -** bánh mì, pho mát, súp trong, rau hoặc trái cây nấu chín - KHÔNG CÓ DA, trứng, sữa chua.
  - ☐ **MUA** - nhận hàng đơn thuốc chuẩn bị của bạn tối thiểu 3 ngày trước khi làm thủ thuật.

- ☐ **1 NGÀY TRƯỚC THỦ TỤC**
  - ☐ **UỐNG NHIỀU NƯỚC**
  - ☐ **KHÔNG RƯỢU**
  - ☐ **CHỈ ĂN ĐỒ LỎNG** - nước, nước luộc gà hoặc rau trong, nước trái cây-KHÔNG BỌT, KHÔNG CHẤT LỎNG ĐỎ / TÍM.

  - ☐ **LỊCH TRÌNH CHUẨN BỊ CỦA COLYTE / GAVILYTE N, C, G / GOLYTELY / NULYTELY / PEG 3350**
    - ☐ Bạn có thể bị đau bụng, chướng bụng, chuột rút, tiêu chảy, đầy hơi và buồn nôn.
    - ☐ Vẫn tiếp tục sử dụng liệu trình vì những triệu chứng này liên quan đến việc pha chế.

    - ☐ **4PM - 6PM → LIỀU LƯỢNG ĐẦU TIÊN**
      - ☐ UỐNG 8 oz = 1 ly dung dịch sau mỗi 15 phút cho đến khi uống hết nửa gallon.

    - ☐ **10PM - 12AM → LIỀU LƯỢNG**
      - ☐ UỐNG 8oz = 1 ly dung dịch sau mỗi 15 phút cho đến khi uống hết cả gallon.

    - ☐ **12AM → NHỊN ĂN VÀ UỐNG SAU ĐÊM**
      - ☐ KHÔNG ĐƯỢC ăn hoặc uống bất kỳ thức ăn hoặc chất lỏng nào.