FAIRFAX COLON & RECTAL SURGERY

COLORECTAL / ANORECTAL PHYSIOLOGY & SURGERY

www.fairfaxcolorectal.com

P: (703) 280-2841

F: (703) 280-4773

Pacientes que toman medicamentos para la diabetes o para bajar de peso (GLP-1/SGLT-2)

Los pacientes que toman estos medicamentos deben seguir una dieta de líquidos claros durante las 24 horas previas a su procedimiento. Estos medicamentos pueden hacer que la digestión sea más lenta y causar náuseas, vómitos o estreñimiento. Esto puede dificultar la limpieza adecuada del colon y causar problemas durante la anestesia.

MEDICAMENTOS:

GLP-1: CONTINÚE TOMÁNDOLOS SI LOS TOLERA BIEN (es decir, si no presenta efectos secundarios como náuseas, vómitos o estreñimiento)

- Ozempic, Wegovy, Rybelsus (semaglutide)
- Mounjaro, Zepbound (tirzepatide)
- Victoza (liraglutide)
- Trulicity(dulaglutide)
- Byetta(exenatide)
- Adlyxin (lixisenatide)

SGLT-2: SUSPENDA ESTOS MEDICAMENTOS A PARTIR DE 3 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- Bexagliflozin (Brenzavvy)
- Canagliflozin (Invokana)
- Canaligflozin/metformin (Invokamet)
- Canaligflozin/metformin XR (Invokamet XR)
- Dapagliflozin (Farxiga)
- Dapagliflozin/metformin XR (Xigduo & Xigduo XR)
- Dapagiflozin, saxaglipitin (Qtern)
- Dapagliflozin/saxaglipitin/metformin (Qternmet XR)
- Empagliflozin (Jardiance), Empagliflozin/metformin (Synjardy)
- Empagliflozin/metformin XR (Synjardy XR)
- Empagliflozin/linagliptin (Glyxambi)
- Empagliflozin/linagliptin/metformin XR (Trijardy XR)

SUSPENDA ESTE MEDICAMENTO 4 DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

- Ertugliflozin (Steglatro)