

Rabia

La rabia es una enfermedad mortal, transmitida por la mordedura de un animal infectado. Es posible que le recomendemos administrar la vacuna contra la rabia si su hijo ha sido mordido o rasguñado por un animal callejero o salvaje. Las inyecciones contra la rabia son sumamente efectivas en la prevención de la enfermedad. La vacuna contra la rabia es segura y tiene pocos efectos secundarios.

¿Qué es la rabia?

La rabia es una enfermedad mortal del sistema nervioso central (cerebro y médula espinal), causada por un virus. Es transmitida por la saliva cuando un animal o un humano son mordidos o rasguñados por un animal infectado.

Gracias a los programas de vacunación de mascotas, los casos de rabia en humanos son raros en los Estados Unidos y otros países desarrollados. (Sin embargo, la enfermedad sigue siendo un problema importante en muchas partes del mundo).

La rabia es muy peligrosa: si una persona se enferma por la mordedura de un animal con rabia, las probabilidades de que muera son muy altas. Ésta es la razón por la cual se suele recomendar la administración de la vacuna contra la rabia después de la mordedura de un animal, especialmente de animales salvajes como los murciélagos.

! *¡Llame a su médico inmediatamente si su hijo ha sido mordido o rasguñado por un animal callejero o salvaje!*

¿Cuál es la causa de la rabia?

La rabia es causada por un virus que afecta a muchos tipos diferentes de animales. Los animales más comúnmente infectados en los Estados Unidos son los zorrillos, mapaches, zorros y murciélagos. Los programas de vacunación de mascotas han reducido en gran medida la incidencia de la rabia en perros y gatos. Sin embargo, esta clase de animales pueden estar infectados con rabia, especialmente si son callejeros.

¿Cuáles son los síntomas?

Afortunadamente, la rabia en los humanos es rara en los Estados Unidos. Cuando se presenta, la rabia causa síntomas como:

- Cambios en el comportamiento, alucinaciones.
- Espasmos de la garganta que hace muy difícil tomar bebidas.
- Miedo al agua (hidrofobia).
- Posible parálisis de una o más extremidades.

Para cuando aparezca alguno de estos síntomas, hay una gran posibilidad de que el paciente muera. Los animales con rabia presentan síntomas similares. Es posible que su médico le pregunte acerca del comportamiento del animal que mordió a su hijo. El tiempo promedio para que una mordedura o rasguño se convierta en rabia es de 4 a 6 semanas. Sin embargo, este periodo de tiempo puede variar entre 5 días y varios meses.

¿Qué pone a su hijo en riesgo de contraer la rabia?

- Ser mordido o rasguñado por un animal infectado. Enseñe a su hijo que nunca debe aproximarse a un animal salvaje o animales callejeros.
- Viajar a ciertos países extranjeros y explorar cuevas o jugar en ellas puede incrementar el riesgo de ser mordido o rasguñado por un animal infectado.
- El contacto con murciélagos puede causar la rabia, incluso si su hijo no es mordido ni rasguñado.

¿Se puede prevenir la rabia?

- Asegúrese de que todas sus mascotas reciban todas las vacunas requeridas contra la rabia. Esto incluye perros, gatos, hurones y otros mamíferos.
- Asegúrese de que su hijo sepa que nunca debe jugar con animales salvajes ni perros o gatos callejeros. Es más probable que la rabia sea transmitida por un gato callejero que por un perro callejero.
- *La vacuna puede evitar que se presente la rabia en caso de que su hijo haya sido mordido o rasguñado por un animal infectado.*

¿Cuál es el tratamiento para la rabia?

Una vez que la rabia se desarrolle, la persona que la ha contraído corre un alto riesgo de morir. Ésta es la razón por la cual la atención médica inmediata es tan importante si su hijo ha sido mordido o rasguñado por un animal desconocido.

Cuidado de la mordedura. Siempre que su hijo sea mordido por un animal, limpie completamente el área de la mordedura.

- Lave bien el área con agua y jabón.
- Enjuague el área por lo menos durante 10 minutos. Esto puede incluir enjuagar con una solución antiséptica como el Betadine (nombre genérico: yodopovidona).

Calcular el riesgo de la rabia. Muchos factores afectan el riesgo de que su hijo desarrolle la rabia después de una mordedura, entre ellos el tipo de animal, el comportamiento del animal y el riesgo de contraer rabia en su comunidad.

- Dígale a su médico todo lo que pueda acerca de la mordedura, como por ejemplo, acerca del comportamiento del animal.
- Si el animal actuaba en forma extraña o agresivamente, existe una mayor posibilidad de que estuviera infectado con la rabia.
- Si el animal es un perro o un gato doméstico que ha sido vacunado, su hijo no estará en riesgo de contraer la rabia.
- Si el animal es un perro o un gato callejero y fue capturado, se puede observar su comportamiento para determinar si tiene rabia. Si el animal no fue capturado, puede ser que su médico recomiende administrar la vacuna contra la rabia a su hijo, sólo para estar seguros.

Eso puede depender de qué tan a menudo se presenten casos de rabia en su área. Es posible que su médico llame al departamento de salud local antes de tomar una decisión.

Vacuna contra la rabia. Se recomendará la administración de la vacuna contra la enfermedad si su médico tiene alguna razón para creer que su hijo fue mordido o rasguñado por un animal con rabia. Es muy importante eliminar hasta la más remota posibilidad de que su hijo desarrolle esta enfermedad mortal.

- El tratamiento con la vacuna de la rabia y las inmunoglobulinas (anticuerpos para la rabia) debe administrarse tan pronto como sea posible después de la mordedura.

- Su hijo recibirá inmediatamente una inyección de la vacuna y una inyección de la inmunoglobulina para la rabia. Estas inyecciones se aplican en el área de la mordedura.
- Su hijo necesitará cuatro inyecciones más que serán administradas en el transcurso de las semanas siguientes. Estas inyecciones se aplican en el brazo. Es muy importante que su hijo reciba todas las inyecciones recomendadas.
- El riesgo de sufrir efectos secundarios es muy bajo. La vacunación es muy efectiva en la prevención de la rabia después de la mordedura de un animal.



¿Cuándo debo llamar a su consultorio?

Siempre llame a su médico si su hijo ha sido mordido o rasguñado por un animal salvaje, callejero o desconocido o si ha estado en contacto con murciélagos.

Llame a nuestro consultorio si su hijo está recibiendo las inyecciones contra la rabia y presenta alguno de los siguientes síntomas:

- Dolor de cabeza.
- Vómito.
- Dificultad para tragar.
- Cambios en el comportamiento.
- Espasmos musculares.
- Miedo al agua.