



ESCLEROTERAPIA

Escleroterapia es el tratamiento más común para las arañitas en las piernas. Estas arañitas, o telangiectasias, son venas anormales, que llevan sangre. Durante el tratamiento, un agente químico, Polidocanol, es inyectado dentro de la vena o capilar. Este químico irrita las paredes internas de las venas, causando un colapso y cierre de la vena. El cuerpo reabsorbe la vena, y la sangre es inmediatamente enrutada a una vena sana.

PROCEDIMIENTO

El tratamiento se realiza en una cómoda habitación con el uso de una lupa especial. Aunque usamos una aguja muy pequeña, las inyecciones se sienten como un pinchazo. Una vez que las venas son inyectadas, las áreas tratadas toman una decoloración rojiza, y aparecerán irritadas por unos pocos días. Esto es normal. Las venas adecuadamente tratadas eventualmente desaparecen.

Típicamente, una sola sesión de tratamiento de escleroterapia dura 30 minutos, y nuestro objetivo es tratar tantas venas como sea posible durante esa sesión. El número de sesiones de tratamiento varía, dependiendo del número de venas inyectadas, su respuesta a cada sesión de tratamiento, y el nivel de perfección cosmética deseado.

PROCEDIMIENTO DEL POSTE

Las actividades diarias normales se pueden reanudar inmediatamente después del tratamiento. Aplicaremos una media de la compresión inmediatamente después del tratamiento y recomendamos el uso continuo de las medias de la compresión por 1-3 días después del tratamiento (usted puede quitarse las medias en la noche si usted necesita una rotura). Recomendamos 4-5 semanas entre cada sesión de escleroterapia para obtener mejores resultados. El día siguiente puede reanudar actividades extenuantes.

Preparación

- El día de su sesión de escleroterapia, ducharse y lavarse las piernas a fondo.
- **Por favor, no se** aplique cualquier crema o loción a sus piernas.
- Para evitar molestias, no se afeite las piernas el día de su cita.

Cosas para evitar

- Por favor evite tomar el sol o la exposición prolongada solar durante los primeros 2-3 días después de su tratamiento

Tenga en cuenta

- Usamos una solución química con la que podría reaccionar. Si tiene comezón o dolor significativo en el sitio de la inyección, déjenos saber.
- Alrededor del 10% de los pacientes desarrollan una decoloración oscurecida dentro de las venas tratadas; si esto ocurre, por favor déjenos saber. Podría ser necesario verte y evaluarte.
- Las áreas tratadas pueden estar temporalmente magulladas, tiernas, ligeramente rojas e hinchadas. Usted puede aplicar el hielo directamente sobre el sitio para la comodidad.